

LABORATOIRE



MANUEL DE PRÉLÈVEMENT

Juin 2025



Accréditation COFRAC n°8-0946



Portée disponible sur www.cofrac.fr

Manuel de Prélèvement

Laboratoire Biocentre – version de Juin 2025

Ce manuel contient les documents suivants :

- DOCECH002 Fiche d'utilisation des tubes V29
- DOCECH017 Ordre de prélèvement des tubes V2
- DOCECH014 Tableau utilisation des tubes par analyse V15
- DOCADM019 Liste des analyses nécessitant renseignements cliniques V7
- DOCECH013 Conditions de réception des prélèvements en bactériologie V12
- DOCECH003 Délais d'exécution analyses V29

LE PRELEVEMENT : UN ACTE DETERMINANT POUR LA QUALITE DES ANALYSES

QUELQUES REGLES SIMPLES A RESPECTER :


- 👉 **Les prélèvements doivent être pris en charge** par le laboratoire dans les 4 heures (6h maxi acceptable).
- 👉 **Une bonne sélection des tubes** : voir les documents mis à votre disposition par le laboratoire. **Merci de respecter le nombre de tubes à prendre** (indiqué par un petit bouchon dans le tableau ci-dessus)
- 👉 **Une bonne identification du patient** : indiquer son nom, nom de jeune fille, prénom, adresse et numéro de téléphone, date de naissance, et pour le tiers payant : son numéro de SS, sa CPAM, l'ouverture des droits et le nom de l'assuré. Une fiche de liaison est disponible auprès du laboratoire (ERECH020).
- 👉 **Une bonne identification des prélèvements** : indiquer le nom et le prénom du patient **sur chaque tube** au moment du prélèvement. Ajouter la date de naissance **et le sexe** pour les tubes de groupes sanguins, phénotypes et RAI. Indiquer la date et l'heure de prélèvement sur l'ordonnance ou la fiche de liaison (ERECH20).
- 👉 **Une bonne identification du préleveur** : identité du préleveur (ou éventuellement son cachet) sur l'ordonnance avec un numéro de téléphone où l'on peut le joindre en cas de nécessité.
 - ☛ *Un problème de prélèvement ou le non-respect des délais peuvent interférer avec la qualité du résultat.*
Par exemple : Des difficultés au moment du prélèvement = Plaquettes diminuées, potassium augmenté
Des délais d'acheminement trop élevé (> 6 heures) = Potassium augmenté, LDH augmenté.
- 👉 **Les prélèvements de bactériologie** (urines, plaies, copro...) doivent être **obligatoirement** être accompagnés d'une fiche de renseignements cliniques (à disposition au laboratoire)
- 👉 Merci d'informer le laboratoire de **toutes difficultés rencontrées** :
 - Lors de l'acte de prélèvement, de la conservation du prélèvement,
 - Lors de l'identification du patient
 - ↳ Utiliser l'ordonnance ou la fiche de liaison afin d'en alerter le laboratoire.

😊 **N'hésitez pas à contacter le laboratoire pour toute information complémentaire**
au 03.20.46.69.04 ou 03.20.36.13.13 😊

Les Biologistes des laboratoires Biocentre vous remercient de votre confiance.

LABORATOIRE BIOCENTRE		FICHE D'UTILISATION DES TUBES DE PRELEVEMENT			DOCECH002
Indice 29	Date 07/02/2025	Nature des modifications : Ajout Insuline, ACTH, SDHEA ; tube CTAD ; suppression sérologies COVID et chlamydia			Document à diffusion non contrôlée
Rédacteur : L. WIJNANTS			Approbateur : V. DECOOL		
Tube sec (avec ou sans gel) Autant de tubes que de	Tube Citrate Autant de tubes que de	Tube EDTA Autant de tubes que de	Tube Héparine 1 seul tube	Tube Héparine + Tube sec gel 1 tube et 1 tube	
Ac solubles (SSA, SSB, RNP, Sm...), anti CCP, anti ADN natif, antinucléaires, anti thyroïdien (thyroglobuline, thyroperoxydase) anti transglutaminase, IgE totales et spécifiques, Phadiatop, Trophatop (adultes / enfants) Ac anti récepteur TSH, CA 125, CA 15.3, CA 19.9, ACE, AFP, Cortisol, FSH, LH, Oestradiol, Progestérone, Prolactine, Testostérone, Ig A, Ig G, Ig M, Préalbumine, Digoxine, Lithium, Folates, B12, Vit D Facteur rhumatoïde MNI Test CMV, EBV, S-DHEA Insuline AMH, Sérologie Lyme Electro et immuno électrophorèse CDT	Antithrombine III, D-Dimères, Fibrinogène, TP / INR, Activité anti Xa (hors HNF), TCA (hors suivi HNF) Facteurs de coagulation REEMPLIR JUSQU'A POINTE DE LA FLECHE (ni plus ni moins) T° ambiante (20 +-5°C) IMPERATIVEMENT Tube CTAD 1 seul tube TCA, Anti Xa (< 5 heures) UNIQUEMENT dans le cadre d'un suivi de HNF	Numération Formule, plaquettes, réticulocytes, Vitesse de sédimentation BNP PTH intacte Hémoglobine Glyquée Paludisme (Recherche) Groupe sanguin, Agglutinines Irrégulières, Coombs direct IMPERATIVEMENT NOTER : Date de naissance + Sexe Tube Citrate + Tube EDTA 1 tube + 1 tube Plaquettes citrate	Acide urique Albumine sérique Apolipoprotéine A1 / B Bilirubine (directe et totale) Calcium, Phosphore Cholestérol (Total, HDL, LDL) CPK totales Créatinine CRP Fer, Ferritine Gamma GT, Transaminases LDH Lipase Magnésium NT proBNP Phosphatases alcalines Procalcitonine Protides Transferrine Triglycérides Troponine Urée Ionogramme : Na, K, Cl, CO2 (réserve alcaline) Hormones : HCG T3L, T4L, TSH	PSA libre et totale Rubéole Syphilis BW Toxoplasmose Hépatite A Hépatite B (AchBc, AchBs, AgHBs) Hépatite C, HIV Tube Fluorure Autant de tubes que de Glycémie, cycles glycémiques, hyperglycémies provoquées Lactates Tube EDTA aprotinine 1 seul tube ACTH (< 4 heures)	
Prélèvement à faire au laboratoire OBLIGATOIREMENT (tubes pré chauffés à 37°C / coagulation à 37°C)					
Cryoglobulines : 4 tubes SANS GEL			Cryofibrinogènes : 4 tubes		

LABORATOIRE BIOCENRE		ORDRE DE PRELEVEMENT DES TUBES	DOCECH017
Indice 2	Date : 05/09/22	Nature des modifications : Suppression du gris iodoacétate	
Vérificateur : L. WIJNANTS		Approbateur : V. DECOOL	



**1. Hémoculture s'il y a lieu
(aérobie puis anaérobie)**



2. Tube citraté



3. Tube sec (avec ou sans gel)



4. Tube hépariné



5. Tube EDTA



6. Tube fluorure

7. Autres tubes s'il y a lieu

LABORATOIRE BIOCENRE		MODALITES DE PRELEVEMENT PAR ANALYSE		DOCECH014 Page 1/2
Indice 15	Date 07/02/2025	Nature des modifications : Mise à jour analyses		
Rédacteur : L. WIJNANTS		Approbateur : V. DECOOL		

Document à diffusion
non contrôlée

Paramètre	T	Instructions particulières
Ac anti ADN natif		
Ac anti CCP		
Ac Anti Nucléaires		
Ac Anti récepteur de la TSH		
Ac Anti transglutaminase		
Ac Anti Thyroïdiens : thyroglobuline, thyroperoxydase		
Ac solubles (SSA, SSB, RNP, Sm...)		
ACE	+	Prendre tube sérothèque
Acétone		Urines échantillon
Acide urique		
Acide urique urinaire		Urines de 24 heures alcalinisées au laboratoire
ACTH		A congeler < 4 heures
Albumine sérique		
Allergènes		
Alpha Foeto protéine	+	Prendre tube sérothèque
AMH		
Antithrombine III		
Apolipoprotéine A1		
Apolipoprotéine B		
Bence Jones		De préférence urines de 24 h
Bicarbonates		
Bilirubine directe		
Bilirubine totale		
BNP (Brain Natriuric Peptid)		
BW (sérologie)	+	Prendre tube sérothèque
BW (sérologie)	+	Exclusivement si prélevé au labo Prendre tube sérothèque
CA 125	+	Prendre tube sérothèque
CA 15.3	+	Prendre tube sérothèque
CA 19.9	+	Prendre tube sérothèque
Calcium		
Calcium urinaire		Urines de 24h acidifiées au labo
CDT		
Chlore		
Chlore urinaire		Urines de 24 heures
Cholestérol		
CMV (CytoMégaloVirus)	+	Prendre tube sérothèque
Coombs direct		Identification obligatoire sur le tube : Nom, prénom, DDN, sexe
Cortisol		A prélever entre 7 et 9h le matin
Cortisol urinaire		Urines de 24 h ou échantillon
Cotinine (recherche)		Conservation à 4°C
Coqueluche PCR		Ecouvillonnage nasopharyngé / M4RT
COVID PCR		Ecouvillonnage nasopharyngé / M4RT
CPK totales		
Créatinine		
Créatinine urinaire		Urines de 24 h ou échantillon

Paramètre	T	Instructions particulières
CRP		
Cryofibrinogènes (recherche)	4	Coaguler à 37°C / 2h mini ; à faire obligatoirement au labo
Cryoglobulines (recherche)	4	Coaguler à 37°C / 2h mini ; à faire obligatoirement au labo
D-Dimères		
Densité urinaire		Urines échantillon
Digoxine		
Drogues (recherche)		A faire de préférence au laboratoire
EBV (sérologie)	+	Prendre tube sérothèque
Electrophorèse des protéines		
Facteur II		
Facteur V		
Facteur VII		
Facteur VIII		
Facteur IX		
Facteur Rhumatoïde	2	2 tubes obligatoires
Facteur X		
Facteur XI		
Fer		
Ferritine		
Fibrinogène		
Folates		A l'abri de la lumière
FSH		
Gamma GT		
Gaz du sang		Prélèvement artériel
Glucose		Tube Fluorure
Glucose urinaire		Urines de 24 h ou échantillon
Grippe PCR		Ecouvillonnage nasopharyngé / M4RT
Groupe Rhésus, Phénotype, Du		
HCG		
HDL Cholestérol		
Hémoglobine Glycosylée (HbA1c)		
Héparinémie (Activité anti Xa) Suivi des HBPM		A traiter dans les 4h (Max 6h acceptable)
Héparinémie (Activité anti Xa) Suivi des HNF		A traiter dans les 4h
Héparinémie (Activité anti Xa) Suivi des HNF		Sur CTAD : à traiter dans les 5h
Hépatite A (Ac IgM)	+	Prendre tube sérothèque
Hépatite B (Ac HBc Ac HBs Ag HBs)	+	Prendre tube sérothèque
Hépatite C (sérologie)	+	Prendre tube sérothèque
HIV (sérologie)	+	Prendre tube sérothèque
IgE totales		
Immuno-Electrophorèse		
Immunoglobulines A, G, M		

T Type de tube : Sec avec gel séparateur (sec acceptable) Citrate (rempli !) CTAD (rempli !) héparine EDTA
 Fluorure EDTA + aprotinine Urines - Le chiffre inscrit avant indique le nombre de tubes à prendre (s'il est > 1)
Bien tenir compte des instructions particulières Pour tout renseignement, merci de contacter le laboratoire.

LABORATOIRE BIOCENTRE		MODALITES DE PRELEVEMENT PAR ANALYSE		DOCECH014 Page 2/2
Indice 15	Date 07/02/2025	Nature des modifications : Mise à jour analyses		
Paramètre	T	Instructions particulières		
INR		Noter traitement et indication A traiter dans les 6 h		
Insuline				
IST (<i>chlo gono mygen</i>) PCR		E swab ou 1 ^{er} jet utinaire		
Lactate		Tube Fluorure		
LDH		A traiter dans les 4h		
LH				
Lipase				
Lithium				
Lyme (sérologie)	+	Prendre tube sérothèque		
Magnésium				
Magnésium urinaire		Urines de 24h acidifiées au labo		
Micro albuminurie		Urines de 24 h ou échantillon		
MNI Test	+	Prendre tube sérothèque		
Nitrites		Urines échantillon		
NT proBNP				
Numération Formule				
Oestradiol				
Paludisme (Recherche)		Indiquer pic de T°, voyages récents, traitement		
pH urinaire		Urines échantillon		
Phadiatop				
Phosphatases alcalines				
Phosphore				
Phosphore urinaire		Urines de 24h acidifiées au labo		
Potassium		A traiter dans les 4h		
Potassium urinaire		Urines de 24 heures		
Préalbumine				
Procalcitonine				
Progestérone				
Prolactine				
Protéines totales				
Protéines urinaires		Urines de 24 h ou échantillon		
PSA totale	+	Prendre tube sérothèque		
PSA libre		A traiter dans les 4 heures		
PTH intacte				
R.A.I (Recherche Agglutinines Irrégulières)		Identification obligatoire sur le tube : Nom, prénom, DDN, sexe		
Réticulocytes				

Paramètre	T	Instructions particulières		
Rubéole IgG (sérologie)		Exclusivement si prélevé au labo + Prendre tube sérothèque		
SDHEA				
Sodium				
Sodium urinaire		Urines de 24 heures		
Spermogramme		Sur rendez-vous au laboratoire des Francs uniquement		
Syphilis TPHA/VDRL (sérologie)	+	Prendre tube sérothèque		
Syphilis TPHA/VDRL (sérologie)	+	Exclusivement si prélevé au labo Prendre tube sérothèque		
T3L				
T4L				
TCA (Temps de Céphaline Activée)		A traiter dans les 4h		
TCA suivi traitements HNF		CTAD : à traiter dans les 5h		
Test de Hühner		Sur RDV aux Francs uniquement		
Test Migration Survie		Sur RDV aux Francs uniquement		
Testostérone				
TGO				
TGP				
Toxoplasmose IgG / Ig M (sérologie)	+	Exclusivement si prélevé au labo Prendre tube sérothèque		
TP (taux de Prothrombine)		Noter traitement et indication A traiter dans les 6 h		
Transferrine				
Triglycérides				
Trophatop (adultes / enfants)				
Troponine				
TSH				
Urée				
Urée urinaire		Urines de 24 heures		
Virus Epstein Barr EBV (sérologie)	+	Prendre tube sérothèque		
VRS PCR		Ecouvillonnage nasopharyngé / M4RT		
Vitamine B12				
Vitamine D				
Vitesse de sédimentation				
Waler Rose	+	: 2 tubes obligatoires		

Recommandations générales :

- ☞ Chaque tube doit être identifié avec à minima nom et prénom du patient (voir groupes sanguins / RAI : instructions particulières).
- ☞ Pour les prélèvements extérieurs : regrouper les tubes dans un sachet fermé et joindre
 - La prescription
 - Les informations concernant le patient (Identité complète y compris nom de jeune de fille, coordonnées, informations tiers payant)
 - L'identification du préleveur (Identité, numéro de téléphone)
- ☞ Lorsqu'il est mentionné « Domicile déconseillé » dans les instructions particulières, cela signifie qu'une fois prélevé, l'échantillon doit être traité rapidement (ex : à congeler dans l'heure). Dans ce cas, il est préférable de faire le prélèvement directement au laboratoire.
- ☞ Pour les sérologies, un échantillon est conservé 1 an en sérothèque. Lorsqu'il est spécifié « prendre tube sérothèque » il faut prélever en plus un tube sec avec gel séparateur

T Type de tube : Sec avec gel séparateur (sec acceptable) Citrate (rempli !) CTAD (rempli !) héparine EDTA
 Fluorure EDTA + aprotinine Urines - Le chiffre inscrit avant indique le nombre de tubes à prendre (s'il est > 1)
Bien tenir compte des instructions particulières Pour tout renseignement, merci de contacter le laboratoire.

LABORATOIRE BIOCENRE		ANALYSES NECESSITANT DES RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ET DES CONDITIONS PARTICULIERES	DOCADM019
Indice 7	Date : 30/05/2025	Nature des modifications : Mise à jour Clairance, hémostase, helikit	

Document à diffusion
non contrôlée

Vérificateur : L. WIJNANTS	Approbateur : V. DECOOL
--------------------------------------	-----------------------------------

Ce document regroupe les analyses pour lesquelles des renseignements cliniques ou thérapeutiques sont nécessaires et des conditions particulières sont à respecter.

Catégorie d'analyses	Renseignements utiles
Agglutinines irrégulières	Vaccination anti D (date et dosage)
Bactériologie / Virologie (Cf. fiches de liaison ERECHXXX)	- But de l'analyse (diagnostic, suivi d'antibiothérapie, ...) - Heure du prélèvement - Traitement en cours, signes cliniques
Spermiologie (cf. fiche de liaison ERECH004)	- Uniquement aux Francs et sur RDV - Délai d'abstinence
Biochimie	- Un jeûne d'au minimum 8 heures et de préférence 12 heures est indispensable pour : - la glycémie, les bilans lipidiques, l'électrophorèse des protéines, la recherche de cryoglobuline/cryofibrinogène, Vitamines (A, B1, B3, B6, B9 ou folates, C et E) - Pour les autres dosages, une restriction alimentaire de 2 heures est recommandée mais non obligatoire. - Clairance de la créatinine selon Cockcroft: indiquer le poids du patient
Test HELIKIT	- Un jeûne d'au minimum 8 heures et de préférence 12 heures est indispensable (ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer) - Ne pas réaliser chez la femme enceinte - Arrêt des antibiotiques depuis un mois - Arrêt du traitement aux IPP depuis 15 jours (voir liste au laboratoire) - Arrêt des anti acides et des pansements gastro intestinaux depuis 24 h
Hyperglycémie provoquée (HPO, Sullivan, G charge...)	- Quantité de sucre ingérée - Heure de prélèvement
Cycles glycémiqes	Heure du prélèvement
Gaz du sang	- Nature de la ventilation (avec ou sans oxygène, volume) - Heure du prélèvement
Hémostase	- Prise éventuelle d'anticoagulants avec nom et posologie - Indication thérapeutique et horaire de dernière prise - Traitement AVK : cible
Hormonologie	- Date des dernières règles / Date de début de grossesse - Prolactine : repos de 20 min préconisé - Cortisol : le matin vers 8h (taux de base). Pour un cycle nycthéral prévoir un dosage à 12h, après 17h et idéalement minuit.
Médicaments (dosages)	- La date et l'heure du prélèvement - La date et l'heure de la dernière prise - Les renseignements de posologie, la raison de la prescription - La date de début de traitement et/ ou de modification de posologie.
Mycologie (cf. fiche de liaison ERECH030)	- Origine géographique - Antécédents - Signes cliniques
Parasitologie / Paludisme (cf. fiche de liaison ERECH007/ERECH032)	- Séjours à l'étranger (date et lieu) - Antécédents

LABORATOIRE BIOCENRE		CONDITIONS DE CONSERVATION DES PRELEVEMENTS DE BACTERIOLOGIE		DOCECH013 Page 1/2
Indice 12	Date : 05/06/25	Nature des modifications : Mise à jour		

Document à diffusion
non contrôlée

Vérificateur : M. DESROUSSEAUX	Approbateur : V. DECOOL
--	-----------------------------------

Prélèvement	Type de Flacon ou support	Durée de conservation	
		Optimale ¹	Délai maximal acceptable ²
Cultures			
Hémoculture	Flacons hémoculture <i>(système BACTALERT)</i>	Dans les meilleurs délais à T° ambiante	< 12h à T° ambiante
Dispositif intravasculaire <i>(Cathéter)</i>	Flacon stérile	≤ 4h à T° ambiante	≤ 24h à 4°C
LCR	Flacon stérile	Transport immédiat à T° ambiante	≤ 2h à T° ambiante
Urines (ECBU)	Flacon stérile <i>(Adulte)</i> ou Poche <i>(Nourrisson)</i>	< 2h à T° ambiante	< 12h à 4°C
	1 ^e jet (pour recherche de GONO)	≤ 2h à T° ambiante /!\ pas au frigo	<i>Non applicable</i>
Sécrétions broncho-pulmonaires <i>(Aspiration bronchique, expectoration)</i>	Flacon stérile	< 2h à T° ambiante	<i>Non applicable</i>
Selles	Flacon propre, à usage unique, fermé		
	⇒ Bactériologie	< 2h à T° ambiante	24 h à 4°C
	⇒ Recherche de virus seule	< 24h à 4°C	< 48h à 4°C
	⇒ Recherche de parasites	≤ 2h à T° ambiante	≤ 12h à 4°C ou maxi 1 nuit à 4°C
	⇒ Recherche de sang	≤ 24h à 4°C	≤ 72h à 4°C
Prélèvements urogénitaux	Ecouvillon avec milieu <i>(E swab)</i>	≤ 2h à T° ambiante	≤ 24h à T° ambiante ³ (/!\ ne pas réfrigérer)
	Stérilet	≤ 2h à T° ambiante	<i>Non applicable</i>
Sperme	Flacon stérile fourni par le laboratoire	≤ 2h à T° ambiante (/!\ ne pas réfrigérer)	<i>Non applicable</i>
Gonocoques	Ecouvillon avec milieu <i>(E swab)</i>	≤ 24h à T° ambiante (/!\ ne pas réfrigérer)	<i>Non applicable</i>
ORL <i>(Gorge, Nez, Sinus, Oreille)</i>	Ecouvillon avec milieu <i>(E swab)</i>	≤ 2h à T° ambiante	≤ 48h à 4°C *
			≤ 24h à T° ambiante Si GONO (/!\ ne pas réfrigérer)
Prélèvement oculaire <i>(yeux)</i>	Ecouvillon avec milieu <i>(E swab)</i>	≤ 2h à T° ambiante	≤ 24h à 4°C *
Plaies, suppurations cutanées	Ecouvillon avec milieu <i>(E swab)</i>	≤ 2h à T° ambiante	≤ 48h à 4°C *
	Biopsies dans un flacon stérile	≤ 2h à T° ambiante	<i>Non applicable</i>
Mycologie <i>(peau, phanères)</i>	Flacon stérile	≤ 48h à T° ambiante	<i>Non applicable</i>
	Ecouvillon avec milieu <i>(E swab)</i>	≤ 2h à T° ambiante	≤ 48h à 4°C *
Suppurations closes <i>(pus)</i> et des séreuses <i>(liquide articulaire, pleural...)</i>	Flacon stérile, seringue obturée	< 2h à T° ambiante	Mettre dans du bouillon Schaedler
	Bouillon Schaedler	< 4h à T° ambiante	< 12h à T° ambiante

¹ Conditions de conservation des prélèvements de bactériologie pour une viabilité optimale des micro-organismes

² Conditions acceptables au-delà du délai optimal (ou si laboratoire fermé) si applicable

³ Si délai entre 24 et 48 H ou si conservé à 4°C → voir Biologiste pour acceptation possible (dans ce cas, réaliser PCR Gono)

* Prélèvement acceptable si conservé à T° ambiante dans le même délai

LABORATOIRE BIOCENRE		CONDITIONS DE CONSERVATION DES PRELEVEMENTS DE BACTERIOLOGIE		DOCECH013 Page 2/2
Indice 12	Date : 05/06/25	Nature des modifications : Mise à jour		

Prélèvement	Type de Flacon ou support	Durée de conservation	
		Optimale ¹	Délai maximal acceptable ²
Prélèvements osseux / articulaires	Flacon stérile, seringue obturée	≤ 2h à T° ambiante	Mettre dans du bouillon Schaedler
	Bouillon Schaedler	≤ 4h à T° ambiante	≤ 12h à T° ambiante
<i>Helicobacter pylori</i>	Milieu de transport fourni/labo	≤ 48h à T° ambiante	Non applicable
<i>Legionella spp</i>	Urines : Flacon stérile	Dans les meilleurs délais à T° ambiante	+ 4°C si délai > 4h
Mycobactéries	Flacon stérile	< 24h à T° ambiante	≤ 72h à 4°C
Mycoplasmes <i>M. hominis, U urealyticum</i>	Urines 1 ^e jet, sperme : flacon stérile	≤ 2h à T° ambiante	≤ 48h à 4°C
	Ecouvillon avec milieu (<i>E swab</i>)	≤ 2h à T° ambiante	≤ 48h à 4°C *
BMR	Ecouvillon avec milieu (<i>E swab</i>)	≤ 2h à T° ambiante	≤ 48h à 4°C *
Recherche de virus (antigéniques) : VRS, Grippe, COVID	Ecouvillon stérile	≤ 2h à T° ambiante	Non applicable

PCR en temps réel		
Chlamydia trachomatis	Ecouvillon avec milieu (<i>E swab</i>)	48 heures à 4°C
	Urine	24 heures à 4°C
Mycoplasma genitalium	Ecouvillon avec milieu (<i>E swab</i>)	48 heures à 4°C
	Urine	24 heures à 4°C
Neisseria gonorrhoeae (uniquement pour technique PCR)	Ecouvillon avec milieu (<i>E swab</i>)	48 heures à 4°C
	Urine	24 heures à 4°C
COVID	Prélèvement nasopharyngé Ecouvillon avec milieu M4RT	5 jours à 4°C
Grippe	Prélèvement nasopharyngé Ecouvillon avec milieu M4RT	5 jours à 4°C
VRS	Prélèvement nasopharyngé Ecouvillon avec milieu M4RT	5 jours à 4°C
Coqueluche	Prélèvement nasopharyngé Ecouvillon E swab orange	5 jours à 4°C

⚠ NE JAMAIS LAISSER UNE AIGUILLE SUR UNE SERINGUE ⚠

Pour le personnel du laboratoire : en cas de non-respect de ces conditions

- Urines de patients directs** : si le traitement antibiotique n'est pas commencé, demander un nouvel échantillon.
- Recueil non-conforme, température et/ou délai non respectés** :
 - Aviser biologiste ou technicien de bactériologie afin de déterminer la conduite à tenir.
 - Tracer l'information sur la fiche de prélèvement et/ou le dossier patient (commentaire dossier) → nécessaire pour l'interprétation des résultats.

¹ Conditions de conservation des prélèvements de bactériologie pour une viabilité optimale des micro-organismes

² Conditions acceptables au-delà du délai optimal (ou si laboratoire fermé) si applicable

³ Si délai entre 24 et 48 H ou si conservé à 4°C → voir Biologiste pour acceptation possible (dans ce cas, réaliser PCR Gono)

* Prélèvement acceptable si conservé à T° ambiante dans le même délai

LABORATOIRE BIOCENRE		DELAI D'EXECUTION DES ANALYSES SPECIALISEES	DOCECH003
Indice 29	Date 07/02/25	Nature des modifications : <u>Mise à jour</u>	
Rédacteur : C. THOMAS		Approbateur : V. DECOOL	

*Document à diffusion
non contrôlée*

Les analyses effectuées à Biocentre sont réalisées tous les jours et les résultats sont disponibles le jour même à partir de 16H, **sauf pour les exceptions ci-dessous** :

	ANALYSES	JOUR ET/OU DELAI
Sérodiagnostics	Waler rose / facteur rhumatoïde	Vendredi (tubes à Bondues < 14h)
	EBV, CMV	Sauf samedi / Délai : 24 h
Allergie	Ig E spécifiques, Phadiatop, Trophatop	Mardi – Mercredi – Vendredi (tubes à Bondues < 14H)
	IgE totales	Mercredi (tubes à Bondues < 14H)
Auto-immunité	Ac Anti Thyroïdiens : thyroglobuline, thyroperoxydase	Lundi – Jeudi (tubes à Bondues < 14H)
	Ac anti récepteurs de la TSH	Lundi- Mercredi- Vendredi
	Ac anti : ADN natif, CCP	Vendredi (tubes à Bondues < 14H)
	Ac anti antitransglutaminase	Mercredi (tubes à Bondues < 14H)
	Ac anti nucléaires ; Ac solubles (SSA, SSB, RNP, Sm, Scl 70...)	Délai : 1 semaine
Electrophorèses	Electrophorèses Protéines (sérums, urines)	Sauf samedi / Délai : 24 h (si après 10h)
	Immuno-électrophorèses, Bence Jones	Délai : 7 jours
	HbA1c (Hémoglobine glycosylée)	Tous les jours sauf samedi > 10 h
Bactériologie	Tout type de prélèvement	3 jours (<i>16 jours pour les liquide articulaire et pus</i>)
	ECBU	Délai : 48 h
Mycologie	Recherche de levures	5 jours
	Dermatophytes	8 jours (<i>1^e résultats</i>) – 4 semaines (<i>complet</i>)
Parasitologie	Tout type de prélèvement	2 jours sauf samedi
Biologie moléculaire	COVID	Délai : à 17h (tubes aux Francs < 12H) Tous les jours sauf samedi
	<i>Chlamydia trachomatis, gonocoque, Mycoplasma genitalium</i> par PCR	Lundi- Mercredi- Vendredi Tubes arrivés la veille aux Francs
Fertilité	☀ Uniquement sur RDV et au laboratoire des Francs ☀	
	Spermogramme, TMS	Sauf le samedi / Délai : 1 semaine
	Hühner	Délai : 48 heures
Divers	Facteurs de coagulation	Lundi, Mercredi, Vendredi
	Cryoglobuline / Cryofibrinogène	Délai : 8 jours
	☀ Coaguler immédiatement 2h mini à 37°C puis centrifuger et transmettre le sérum décanté	
Biochimie	CDT	Mardi – Vendredi (tubes aux Francs < 8H)
	ACTH, Insuline, S DHEA	Mardi – Vendredi
	PTH	Sauf samedi / Délai : 24 h

☞ Lorsque le jour de réalisation d'une analyse coïncide avec un jour férié, ce calendrier est susceptible d'être modifié.

Laboratoire Biocentre

5 laboratoires de biologie médicale accrédités COFRAC* au service des patients



Laboratoire du Centre Ville



13-15 rue du Général Leclerc
59200 TOURCOING

☎ : 03.20.36.13.13


☎ : 03.20.27.19.55

✉ : celaq@laboratoirebiocentre.fr

Horaires d'ouverture : 7h à 18h30 sans interruption

Le samedi : 7h - 12h30

Vos biologistes : Mesdames D. Leman et S. Fily



Laboratoire des Francs



121 rue des Francs
59200 TOURCOING

☎ : 03.20.46.69.04


☎ : 03.20.46.67.39

✉ : celaq@laboratoirebiocentre.fr

Horaires d'ouverture : 7h à 18h30 sans interruption

Le samedi : 7h - 12h30

Vos biologistes : Monsieur M. Hammad et Madame L. Pâris,



Laboratoire Mercure



95, rue du Canal
59200 TOURCOING

☎ : 03.20.28.13.85


☎ : 03.20.24.37.58

✉ : celaq@laboratoirebiocentre.fr

Horaires d'ouverture : 7h - 13h

Le samedi : 7h - 12h

Vos biologistes : Madame C. Thomas



Laboratoire de Bondues



494 av du Gal de Gaulle
59 BONDUES

☎ : 03.20.23.23.52


☎ : 03.20.23.23.52

✉ : celaq@laboratoirebiocentre.fr

Horaires d'ouverture : 7h - 12h et 14h - 18h

Le samedi : 7h - 12h

Votre biologiste : Mesdames M. Desrousseaux et S. Fily



Laboratoire de Roncq



383 rue de Lille
59223 Roncq

☎ : 03.20.37.52.52

☎ : 03.20.94.16.32

✉ : celaq@laboratoirebiocentre.fr

Horaires d'ouverture : 7h - 12h et 14h - 18h

Le samedi : 7h - 12h

Vos biologistes : Madame V. Decool

