

LABORATOIRE BIOCENTRE		ANALYSES NECESSITANT DES RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ET DES CONDITIONS PARTICULIERES	DOCADM019
Indice 7	Date : 30/05/2025	Nature des modifications : Mise à jour Clairance, hémostase, helikit	

Document à diffusion
non contrôlée

Vérificateur : L. WIJNANTS	Approbateur : V. DECOOL
--------------------------------------	-----------------------------------

Ce document regroupe les analyses pour lesquelles des renseignements cliniques ou thérapeutiques sont nécessaires et des conditions particulières sont à respecter.

Catégorie d'analyses	Renseignements utiles
Agglutinines irrégulières	Vaccination anti D (date et dosage)
Bactériologie / Virologie (Cf. fiches de liaison ERECHXXX)	- But de l'analyse (diagnostic, suivi d'antibiothérapie, ...) - Heure du prélèvement - Traitement en cours, signes cliniques
Spermiologie (cf. fiche de liaison ERECH004)	- Uniquement aux Francs et sur RDV - Délai d'abstinence
Biochimie	- Un jeûne d'au minimum 8 heures et de préférence 12 heures est indispensable pour : - la glycémie, les bilans lipidiques, l'électrophorèse des protéines, la recherche de cryoglobuline/cryofibrinogène, Vitamines (A, B1, B3, B6, B9 ou folates, C et E) - Pour les autres dosages, une restriction alimentaire de 2 heures est recommandée mais non obligatoire. - Clairance de la créatinine selon Cockcroft: indiquer le poids du patient
Test HELIKIT	- Un jeûne d'au minimum 8 heures et de préférence 12 heures est indispensable (ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer) - Ne pas réaliser chez la femme enceinte - Arrêt des antibiotiques depuis un mois - Arrêt du traitement aux IPP depuis 15 jours (voir liste au laboratoire) - Arrêt des anti acides et des pansements gastro intestinaux depuis 24 h
Hyperglycémie provoquée (HPO, Sullivan, G charge...)	- Quantité de sucre ingérée - Heure de prélèvement
Cycles glycémiqes	Heure du prélèvement
Gaz du sang	- Nature de la ventilation (avec ou sans oxygène, volume) - Heure du prélèvement
Hémostase	- Prise éventuelle d'anticoagulants avec nom et posologie - Indication thérapeutique et horaire de dernière prise - Traitement AVK : cible
Hormonologie	- Date des dernières règles / Date de début de grossesse - Prolactine : repos de 20 min préconisé - Cortisol : le matin vers 8h (taux de base). Pour un cycle nycthéral prévoir un dosage à 12h, après 17h et idéalement minuit.
Médicaments (dosages)	- La date et l'heure du prélèvement - La date et l'heure de la dernière prise - Les renseignements de posologie, la raison de la prescription - La date de début de traitement et/ ou de modification de posologie.
Mycologie (cf. fiche de liaison ERECH030)	- Origine géographique - Antécédents - Signes cliniques
Parasitologie / Paludisme (cf. fiche de liaison ERECH007/ERECH032)	- Séjours à l'étranger (date et lieu) - Antécédents